

INSTRUCCIONES PARA ANESTESIA INTRAVENOSA

- **NO debe comer ni beber nada (ni siquiera agua)** por lo menos Ocho (8) horas antes de su cirugía. **Con excepción de medicamentos recetados normalmente tomados en la mañana con una mínima cantidad de agua.**
- **NO** debe consumir bebidas alcohólicas por 24 horas antes de su cirugía ni mientras tomes medicamentos prescritos por el Dr. Sein Moe.
- Un adulto responsable debe acompañarlo a su cita y debe llevarlo a su casa una vez le den de alta. Esta persona debe quedarse con usted durante las primeras 4 a 6 horas después de la cirugía.
- Use ropa cómoda. **Se requieren camisas sueltas y de manga corta.** Use zapatos planos y cómodos. No se permiten tacones altos. Lentes contacto incluyendo lentes de uso extendido deben ser removidos antes de su cita. Lentes de contacto y soluciones para esto no están disponibles en nuestra oficina.
- Aretes o piercings en el labio o en la lengua deben ser removidos antes de su cita.
- Por favor notifíquenos si usted desarrolla un resfriado, fiebre, tos o dolor de garganta antes de su cita.
- **UÑAS:** Remueva **TODA la pintura de uñas, uñas acrílicas, de gel, etc** por lo menos dos dedos **de la mano derecha y dos de la mano izquierda** (preferiblemente dedos corazón e índice). Esto es mandatorio para monitorear los signos vitales del paciente durante la anestesia para la seguridad del paciente, de lo contrario se podría cancelar la cita.
- **NO OBJETOS DE VALOR:** Carteras, billeteras, joyas, celulares y otros objetos de valor deben ser entregados a su acompañante durante la cirugía. Nuestra oficina no se hace responsable por objetos dañados o extraviados durante la cirugía.
- **NO CELULARES:** Debido a Regulaciones Federales de Confidencialidad (HIPAA), el uso de teléfonos celulares está prohibido en áreas de tratamiento. Esto incluye llamadas telefónicas, fotos, videos y grabaciones.
- **MUJERES:** Usted debe cancelar su cita si existe la posibilidad de estar embarazada.
- Usted recibirá prescripciones para medicamentos el día de la cirugía. Por favor notifique a nuestro personal clínico si necesita medicamento para la náusea después de la anestesia.